

ILDONG

푸레파인 연고



일반의약품

의약품분류번호 256[치질용제]


치질로 인한 통증, 부종(부기), 출혈, 가려운 증상에 효과적인, 푸레파인 연고

푸레파인 연고는 유효성분이 증상부위에 국소적으로 작용하여 치질로 인해 나타나는 통증, 부종(부기), 출혈, 가려운 증상을 효과적으로 개선합니다.

사용방법 영상



치질이란?



항문의 피부와 혈관조직이 늘어나 발생하는 질환으로, 보통 치핵과 같은 의미로 사용됩니다. 치핵은 치상선을 기준으로, 위쪽 점막조직에 발생하는 내치핵, 치상선 아래쪽 피부조직에 발생하는 외치핵으로 구분됩니다.

내치핵 증상 : 점막조직에 발생하는 내치핵이 커지면 변을 볼 때 항문 밖으로 밀려나오거나, 점막에 상처가 생기면서 출혈이 발생합니다.

외치핵 증상 : 피부조직에 발생하는 외치핵은 늘어난 피부가 항문 밖으로 만져지거나 출혈로 인해 혈전이 발생하면서 외치핵이 붓고 심한 통증이 나타납니다.

유발요인



[변비]



[배변습관]



[임신/출산]



[음주]

치질은 변비나 화장실에 오래 앉아있는 습관, 임신/출산, 지나친 음주 등 항문 주위 혈관을 늘어나게 하는 다양한 요인에 의해 발생·악화되므로 주의하는 것이 좋습니다.

원료약품 및 분량(1g 중)

- 유효성분
리도카인(KP)..... 30.0mg
알란토인(USP) 10.0mg
테트라히드로졸린염산염(USP) 0.5mg
클로르헥시딘염산염(KP) 5.0mg
L-멘톨(KP) 5.0mg
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1.0mg,
파라옥시벤조산프로필 1.0mg
- 기타 첨가제 : 경질유동파라핀, 농글리세린, 페트롤라툼, 폴리
소르베이트80

성 상

연한 노란색의 연고제

효능·효과

치열·치핵의 아픔·가려움·부종(부기)·출혈의 일시적 완화 및 소독

용법·용량

성인 및 청소년(만 15세 이상)
도포하는 경우: 1일 3회의 범위 내에서 환부(질환 부위)에 직접 바릅니다.
주입하는 경우: 1회 2g, 1일 3회의 범위 내에서 직장내 삽입하여 주입합니다.
직장내 적용할 경우 주입기를 튜브에 끼우고 직장내 삽입합니다.

사용상의 주의사항

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
 - 1) 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 전립샘비대증으로 인한 배뇨곤란 환자
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
 - 1) ~~dl~~ 메틸에페드린염산염, 스코폴리아 엑스 및 글리시리진산 함유 좌제 또는 연고제, 크림제
 - 2) 혈압강하제, 항우울약
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약 사용에 의해 충혈되어 붉어짐, 부종(부기), 자극감 등의 증상이 나타날 경우
- 2) 이 약 사용에 의해 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우
- 3) 7일정도 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우
- 4) 출혈이 있는 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게는 사용하지 마십시오.
- 3) 이 약은 항문부위에만 사용하고 안과용으로는 사용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30°C)보관

포장단위

28g/튜브

※ 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국 개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 이 설명서는 2022년 1월 14일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고·피해구제 상담 :
한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

제조사 : (주)퍼슨

충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

제조의뢰자 : 일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우뎬로27길 2

공장 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화)080-022-1010 (수신자부담)